

ВЛИЯНИЕ ЭРОЗИИ ШЕЙКИ МАТКИ НА ИСХОД И ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ**Шпудейко Анна Дмитриевна**

студент, Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь, г. Гомель

Демидович Полина Сергеевна

студент, Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь, г. Гомель

Дудкина Яна Юрьевна

студент, Гомельский государственный медицинский университет, Беларусь, г. Гомель

Введение: За последние годы, все чаще при гинекологических осмотрах девушек фертильного возраста обнаруживается эрозия шейки матки. Эта патология представляет собой изменения эпителия влагалищной части шейки матки в результате травматического или воспалительного влияния на нее. Клинически она может протекать безболезненно и бессимптомно и проявляться только обильными слизистыми выделениями или кровянистыми выделениями после полового контакта.

В подавляющем большинстве случаев показаний для лечения эрозии шейки матки нет.

Но иногда во время беременности возникают осложнения или обостряются ранее не замеченные болезни.

Существует несколько форм эрозии : истинная, эктопия (псевдоэрозия), врожденная эрозия. Выявить ее можно при помощи исследования в зеркалах или кольпоскопии.

Цель: Выявить закономерность между наличием эрозии шейки матки и патологией беременности. Изучить особенности течения беременности и родов при данном состоянии.

Материалы и методы: В процессе исследования использовались различные методы: метод сбора, метод обобщения и анализа, статистический метод. Были проанализированы амбулаторные карты 200 женщин в возрасте от 17 до 35 лет, дополнительно так же нами были изучены: истории развития новорожденных и истории родов этих женщин.

Для обработки данных которые были получены в ходе исследования были использованы программы Excel, Statistic.

Результаты: При анализе амбулаторных карт 200 женщин было выявлено, что у 74(37%) есть эрозия шейки матки. При этом у них не было выявлено других заболеваний, которые могли бы повлиять на эрозию и течение беременности в целом. Беременность завершилась живорождением у 74(100%) женщин. У 1(1.35%) угроза разрыва шейки матки. Беременность протекала без осложнений у 73(98.65%).

Выводы: Таким образом эрозия шейки матки является очень частой патологией и не является отрицательным преморбидным фоном для течения беременности. Однако во время беременности эрозия может увеличиваться и прогрессировать из-за изменений, которые происходят в женском организме и могут быть связаны с гормональным фоном, состоянием иммунитета и т.п. Поэтому она требует постоянного наблюдения до и во время беременности, что бы снизить риск разрыва слизистой шейки матки во время родов.

Список литературы:

1. Гинекология : учеб. / под ред. С. Н. Занько. Минск: Выш. шк., 2010.
2. Доброкачественные заболевания матки А.Н. Стрижаков, А.И.Давыдов, В.М.Пашков, В.А. Лебедев – Санкт-Петербург, ГЭОТАР – Медиа, 2011 г. – 288.
3. Гинекология: учебник / под ред. Г.М. Савельевой, В.Г Бреусенко. — 3-е изд. — М., 2008. — 432 с.
4. Шелпакова Л.В. Воспалительные заболевания шейки матки у беременных, прогнозирование и профилактика акушерских осложнений: Автореф. дис.... канд. мед. наук. — Омск, 1991. — 22 с.
5. Черкасский Л.А., Мазуровская О.П. О патологических процессах шейки матки // Вопросы онкологии. — 1972. — №11. — С. 40—46.
6. Сивочалова О.В. Эрозия шейки матки // Фельдшер и акушерка. — М., 1984. - №4. - С. 21-24.
7. Бодяжина В.И., Сметник В.Л., Тумилович Л.Г. Неоперативная гинекология: Руководство для врачей. М.: Медицина, 2006. - 544 с.