

ФАРМАКОТЕРАПИЯ ПАПИЛЛОМАВИРУСНЫХ ПОРАЖЕНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ ИЗОПРИНОЗИНОМ

Ансимова Полина Викторовна

студент Курского государственного медицинского университета, РФ, г. Курск

Болдина Наталья Владимировна

научный руководитель, старший преподаватель Курского государственного медицинского университета, РФ, г. Курск

Цель исследования. Исследовать результаты терапии хронических воспалительных заболеваний женской репродуктивной системы – папилломавирусных заболеваний.

Материалы и методы. Было проведено исследование у 550 пациенток с поражением шейки матки папилломавирусной инфекцией.

Результаты исследования. Среди 550 исследуемых пациенток 210 (29 %) были в возрасте до 25 лет, 145 девушек (24%) – в возрасте 35-45 лет, 175 (26 %) – в возрасте от 45-55 лет и 20 (21 %) – старше 55 лет. Практически у каждой 3 девушки (276 – 41 %) проявлялась характерная симптоматика папилломавирусной инфекции – остроконечные кондиломы в области влагалища и наружных половых органов, наиболее часто встречались у девушек молодого возраста до 25 лет (26%). У пациенток старше 55 лет намного реже выявляются остроконечные кондиломы, в 1,5 раза, и составляют 18 %. Наиболее распространенными изменениями шейки матки у

обследуемых женщин были проявления псевдоэрозии и эндоцервицита, выявленные у 375 (65 %) и у 321 (48%) соответственно. Также отмечается, что у 121 (19 %) визуально не определяются изменения шейки матки. При кольпоскопическом исследовании обнаружено, что практически у половины (у 260 из 550 – 43 %) был выявлен атипичный эпителий с наибольшей частотой у девушек в возрасте до 25 лет – 48 %.

Выводы. Было выявлено, что расширенная кольпоскопия дает высокоэффективное преимущество дифференцировать связанные с папилломавирусной инфекцией поражения шейки матки различной степени тяжести. Несомненно, что применение изопринозина в составе комплексной терапии увеличивает их эффективность и позволяет провести профилактику папилломавирусных поражений шейки матки.

Одним из основных направлений профилактики РШМ является раннее выявление и лечение женщин с ВПЧ-ассоциированными заболеваниями. В настоящее время придается большое значение изучению ускорения элиминации высокоонкогенных типов ВПЧ при их персистенции, разрабатываются наиболее эффективные, малотравматичные и безопасные методы лечения ВПЧ-ассоциированных заболеваний. У пациенток с «минимальным» повреждением эпителия шейки матки (ASCUS) с наличием цитоплазматического эффекта ВПЧ (койлоцитоз при цитологическом исследовании) и положительным ВПЧ-тестом актуальным является применения препарата Изопринозин (инозин пранобекс) с двойным противовирусным действием на пораженную вирусом ткань. К настоящему времени опубликованы результаты многочисленных клинических исследований по препарату Изопринозин (инозин пранобекс). В частности, систематический обзор источников литературы и метаанализ применения Изопринозина в виде монотерапии убедительно свидетельствуют о высоком лечебном эффекте препарата при ВПЧ-ассоциированных

патологических изменениях слизистых оболочек урогенитального тракта (см. рисунок).

Список литературы:

1. Хрянин А. А., Решетников О. В. Папилломавирусная инфекция: современный взгляд на эпидемиологию, профилактику и лечение //Гинекология. – 2013. – Т. 15. – №. 5. – С. 4-8.
2. Подзолкова Н. М. и др. Папилломавирусная инфекция как фактор репродуктивного риска (обзор литературы) //Проблемы репродукции. – 2008. – №. 1. – С. 24-29.
3. Коломиец Л. А., Уразова Л. Н. Генитальная папилломавирусная инфекция и рак шейки матки. – Общество с ограниченной ответственностью" Издательство научно-технической литературы", 2002.
4. Шипицына Е. В. и др. Папилломавирусная инфекция: факторы риска цервикальной неопластической прогрессии //Журнал акушерства и женских болезней. – 2004. – Т. 53. – №. 3.